



呉市役所  
子育て施設課  
0823-25-3144

## 子どもの感染症と予防接種



生まれたばかりの頃は、母親からの抗体（免疫）があるため、かぜなどをひきにくいのですが、赤ちゃん自身の免疫が未熟なので、感染症にかかると重症化しやすくなります。母親からの免疫は、数カ月でなくなってしまいます。したがって、生後2～3か月を過ぎた頃から、さまざまな感染症にかかりやすくなります。

「保育園に入るとかぜをひいてばかりで、うちの子は免疫が弱いのではないか？」と悩むこともあるかと思います。たくさんの感染症が流行している集団で、免疫が未熟な子どもが生活を始めると、さまざまな感染症に繰り返しかかってしまうことになります。

一度感染症にかかると免疫を獲得し抵抗力がつくため、以後、その感染症にかかりにくくなります。

免疫を獲得する作用を利用したのが「予防接種」です。

### 予防接種の目的

感染症にかかる前にワクチンによって免疫をつけ、感染症にならないようにしたり、かかっても重症化するのを防いだりします。



集団生活を始める前には、できるだけ接種可能な予防接種を済ませておきましょう。



### 【B型肝炎ワクチンについて】

平成28年10月から定期接種になりました。

B型肝炎は、急性肝炎となりそのまま回復する場合もあれば、慢性肝炎となる場合もあります。年齢が低いほど、急性肝炎の症状は軽いかあるいは症状はあまりはっきりしない一方、ウイルスがそのまま潜んでしまう持続感染（キャリア）となることもあり、予防接種は重要といえます。

※1歳までに3回受けなければならないのでご注意ください！！

# 予防接種法に基づく予防接種の一覧とスケジュール例

(出生後～7歳6か月まで)

★定期予防接種(無料) ※ただし、指定の期間以外は有料になります。

| ワクチン名   | 接種回数 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 1歳 | 1歳半 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 7歳半 |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 不活化<br>ヒブ   | 4回   |     | ↓   | ↓   | ↓   |     |     |     |     |     | ↓  |     |    |    |    |    |    |    |     |
| 不活化<br>小児用肺炎球菌  | 4回   |     | ↓   | ↓   | ↓   |     |     |     |     |     | ↓  |     |    |    |    |    |    |    |     |
| 不活化<br>B型肝炎 (H28.10.1から)                                    | 3回   |     | ↓   | ↓   |     |     |     |     |     | ↓   |    |     |    |    |    |    |    |    |     |
| 不活化<br>4種混合<br>・ジフテリア(D)<br>・百日咳(P)<br>・破傷風(T)<br>・ポリオ(IPV) | 4回   |     |     | ↓   | ↓   | ↓   | ↓   |     |     |     |    | ↓   |    |    |    |    |    |    |     |
| 生<br>BCG (結核)   | 1回   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |
| 生<br>MR混合 (麻しん風しん)  | 2回   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     | ↓  |    |    |    |    |    | ↓   |
| 生<br>水痘 (水ぼうそう)   | 2回   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     | ↓  | ↓  |    |    |    |    |     |
| 不活化<br>日本脳炎   | 3回   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |

■ 無料で接種できる年齢

■ 標準的な接種年齢

↓ 接種

【DT2期】1回接種  
11歳以上13歳未満

小学校就学前の  
1年間(年長児)

【2期】1回接種  
9歳以上13歳未満

★任意予防接種(料金が必要です) ※必ずではありませんが、できるだけ受けるようにしましょう。

- ・ロタウイルス……生後6週以降、4週以上の間隔で計2回と、計3回の2種類のワクチンがあります。
- ・おたふくかぜ……12か月以降 1～2回  
※保育所など集団生活に入る子は早めに
- ・インフルエンザ……生後6か月以降 2～4週間隔2回(毎年)  
※10月後半から流行期前に

【生】ワクチン……生きた病原体を弱めて作った予防接種

【不活化】ワクチン……病原体を殺菌し、免疫を作るために必要な成分だけを取り出して作った予防接種



★ かかりつけ医とよく相談し、適切な時期にできるだけ予防接種を受けるようにしましょう！

ほけんだよりは、くれ子育てねっとの子育て支援サービスでもご覧になることができます。

URL <http://www.kure-kosodate.com/>