



第77号
平成19年4月

子育て施設課
電話 0823-25-3144

(問合わせ)
呉市保健所保健総務課
電話 0823-25-3525

【 予 防 接 種 】

感染症のなかには、一度かかると体内に免疫がつくられ、同じ病気にかからなくなるものがあります。これを応用し、ウイルスや細菌を一定の処理で殺したり、弱くしたりしたものを、体内に入れることで免疫をつくるのが予防接種です。

感染症から自分の子どもはもちろん、まわりの子どもたちを守るために予防接種の効果と副反応をよく理解し、予防接種を受けましょう。

〔 定期接種 〕

予防接種法により定められた予防接種です。

定期接種で事故があった場合は、健康被害救済制度により補償が行われます。

定期接種は定められた期間であれば無料です。



《BCG》

結核に対する抵抗力(免疫)をつけるために BCG を接種します。(生後3ヶ月～6ヶ月未満)

《ポリオ》

小児マヒを予防するワクチンです。このワクチンは経口ワクチンで、飲むことによって免疫をつくります。呉市では、春と秋に実施されています。

《麻しん・風しん》

麻しん・風しんの予防接種は2回接種になりました。1期に1回、2期に1回麻しん・風しん混合ワクチンを接種します。ただし、どちらかにかかったことのある人や希望する人は単独のワクチンを接種できます。

《ジフテリア(D)・百日咳(P)・破傷風(T)》

混合ワクチン (DPT) として生後3ヶ月から接種できます。百日咳は、乳児がかかると重症になることもあるので、予防接種は受けておきましょう。

*** 予防接種カレンダー ***

()内は標準的な接種期間(望ましい時期)

ワクチン名	出生後	3ヶ月	6ヶ月	9ヶ月	1歳	1歳6ヶ月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳
BCG																			
ポリオ																			
麻しん(M) 風しん(R) 混合ワクチン(MR)																			
麻しんワクチン																			
風しんワクチン																			
ジフテリア(D)百日咳(P)破傷風(T) 三種混合ワクチン(DPT) 二種混合ワクチン(DT)																			
日本脳炎																			


望ましい接種年齢



接種可能な年齢(法定接種対象年齢)



接種間隔



《日本脳炎》

平成17年5月に予防接種による健康被害が否定できない重症例が発生したことから、現行のワクチンについては慎重を期すため積極的に勧められていません。ただし、日本脳炎の流行地域へ渡航する方、蚊にさされやすい地域や環境にある方などで、本人や保護者が特に希望する場合は受けることができます。

[任意接種]

任意の予防接種には、**おたふくかぜ**（流行性耳下腺炎）、**水ぼうそう**（水痘）、**インフルエンザ**、**B型肝炎**などがあります。

任意接種で事故があった場合は、他に賠償の責任を有する者がなければ、医薬品副作用被害救済制度により補償が行われます。

任意接種は全額自己負担です。