



第89号  
平成20年4月

子育て施設課  
電話 0823-25-3144

(問合わせ)  
呉市保健所保健総務課  
電話 0823-25-3525

## 【 予 防 接 種 】

感染症のなかには、一度かかると体内に免疫がつくられ、同じ病気にかからなくなるものがあります。これを応用し、ウイルスや細菌を一定の処理で殺したり、弱くしたりしたものを、体内に入れることで免疫をつくるのが予防接種です。


感染症から自分の子どもはもちろん、まわりの子どもたちを守るために予防接種の効果と副反応をよく理解し、予防接種を受けましょう。

### 〔 定期接種 〕

予防接種法により定められた予防接種です。

定期接種で事故があった場合は、健康被害救済制度により補償が行われます。

定期接種は定められた期間であれば無料です。



### 《BCG》

結核に対する抵抗力(免疫)をつけるために BCG ワクチンを接種します。

(生後3～6ヶ月未満)

### 《ポリオ》

小児マヒを予防するワクチンです。このワクチンは経口ワクチンで、飲むことによって免疫をつくります。呉市では、春と秋に集団接種として実施しています。

### 《麻しん・風しん》

はしか・三日ばしかを予防するワクチンです。麻しん・風しん混合ワクチンを 2回接種 します。ただし、どちらかにかかったことのある人や希望する人は単独のワクチンを接種できます。

※ 麻しんの予防には2回接種が効果的であるとして、これまで2回接種の機会がなかった世代を対象に、平成20年4月1日から5年間の期限付きで、3期(中学1年生)、4期(高校3年生)のいずれか1回を定期接種として受けることができるようになりました。上のお子さんが対象となる方は参考にしてください。

# \*\*\* 予防接種カレンダー \*\*\*

( )内は標準的な接種期間(望ましい時期)

	ワクチン名	出生後	3ヶ月	6ヶ月	9ヶ月	1歳	1歳6ヶ月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	
定期接種	BCG		■	■																	
	ポリオ		■																		
	麻しん(M)風しん(R)混合(MR)				■						■										■
	麻しん単抗原(注) 風しん単抗原(注)	1期→生後1~2歳未満 2期→生後5~7歳未満で小学校就学前の1年間[保育所・幼稚園では年長児] ※3期→中学校1年生に相当する1年間(平成20年4月から5年間のみの補足的接種) ※4期→高校3年生に相当する1年間(平成20年4月から5年間のみの補足的接種) (注)原則として混合(MR)ワクチンを接種。なお、同じ期内で麻しんワクチンまたは風しんワクチンのいずれか一方を受けた者および麻しんまたは風しんのいずれか一方にかかったことのある者、あるいは特に単独ワクチンの接種を希望する者は単抗原ワクチンを接種することもできます。																			
	ジフテリア(D)百日咳(P)破傷風(T) 三種混合(DPT1期) 二種混合(DT2期)		■																		
日本脳炎																					


望ましい接種年齢



接種可能な年齢(法定接種対象年齢)



## 接種間隔



## 《ジフテリア(D)・百日咳(P)・破傷風(T)》

混合ワクチン(DPT)として生後3ヶ月から接種できます。百日咳は、乳児がかかる  
と重症になることもあるので、予防接種は受けておきましょう。

## 《日本脳炎》

平成17年5月に予防接種による健康被害が否定できない重症例が発生したことから、  
現行のワクチンについては慎重を期すため積極的には勧められていません。ただし、日本  
脳炎の流行地域へ渡航する方、蚊にさされやすい地域や環境にある方などで、本人や保護  
者が特に希望する場合は受けることができます。